Géométrie dans l'espace

I - Droites et plans : positions relatives

→ définitions

- Deux plans de l'espace sont **strictement parallèles** s'ils n'ont aucun point commun.
- Une droite et un plan de l'espace sont **strictement parallèles** s'ils n'ont aucun point commun.
- Deux droites de l'espace sont **strictement parallèles** si elles sont coplanaires et qu'elles n'ont aucun point commun.

→ positions relatives de deux plans

- Deux plans peuvent être **confondus**.
- Deux plans peuvent être **strictement parallèles**.
- Deux plans peuvent être **sécants selon une droite**.

→ positions relatives d'une droite et d'un plan

- Une droite peut être **incluse** dans un plan.
- Une droite et un plan peuvent être **strictement parallèles**.
- Une droite et un plan peuvent être **sécants en un point**.

→ positions relatives de deux droites

Deux droites peuvent être **coplanaires**.

On distingue alors trois cas :

- elles sont **confondues** ;
- elles sont **strictement parallèles** ;
- elles sont **sécantes**.

II - Orthogonalité**1 - Orthogonalité de deux droites****a - Définition :**

Deux droites (D) et (D') sont dites orthogonales si leurs parallèles passant par un point quelconque de l'espace sont perpendiculaires.

On note $(D) \perp (D')$.

b - Propriété :

Si deux droites sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre.

Remarque :

Deux droites perpendiculaires à la même droite ne sont pas obligatoirement parallèles entre elles !

2 - Orthogonalité d'une droite et d'un plan**a - Définition :**

Une droite (D) est perpendiculaire à un plan (P) si elle est orthogonale à toutes droites de ce plan. On note $(D) \perp (P)$.

b - Propriété :

1. Une droite est orthogonale à un plan si, et seulement si, elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.
2. Si deux droites sont parallèles, alors tout plan orthogonal à l'une est orthogonal à l'autre.
3. Si deux droites sont orthogonales au même plan, alors elles sont parallèles.

c- Propriété :

1. Si deux plans sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'un est orthogonale à l'autre.
2. Si deux plans sont orthogonaux à une même droite, alors ils sont parallèles.

III - Géométrie vectoriel dans l'espace**1 - Caractérisation d'un plan par un point et deux vecteurs non colinéaires****Définition :**

Soit A est un point de l'espace, $\vec{i}$ et $\vec{j}$ deux vecteurs non colinéaires.

Soit I et J les points tels que $\vec{AI} = \vec{i}$ et $\vec{AJ} = \vec{j}$. L'ensemble des points M tels que $\vec{AM} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j}$, avec α et $\beta \in \mathbb{R}$, est le plan (AIJ) .

On dit que le plan (P) est dirigé par le couple $(\vec{i}, \vec{j})$.

2 - Vecteurs coplanaires**a - Définition :**

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace.

On dit que les trois vecteurs précédents sont coplanaires s'il existe trois réels non tous nuls α , β et γ tels que : $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w} = \vec{0}$.

Remarques :

- Trois points sont toujours dans un même plan (coplanaires).
- Deux vecteurs sont toujours coplanaires. En effet, on peut trouver deux représentants de deux vecteurs dans un même plan.

b - Théorème :

Les points A , B , C et D sont coplanaires si, et seulement si, les vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$ sont coplanaires.

Remarques :

- La droite $(A; \vec{u})$ et le plan $(B; \vec{v}; \vec{w})$ sont parallèles si, et seulement si, $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires.
- $(AB) // (CDE)$ si et seulement si, $\vec{AB}$, $\vec{CD}$ et $\vec{CE}$ sont coplanaires.

c- Propriété et définition :

Soit $\vec{u}$ un vecteur de l'espace et $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires.

Alors, il existe un unique triplet de réels x , y , et z tels que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ sont les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

IV - Repérage dans l'espace**1 - Repère de l'espace****a - Définition :**

Soient $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires et O un point fixe.

On peut alors munir l'espace du repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Il existe un unique triplet (x, y, z) tel que, pour tout point M de l'espace, on a : $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

x est l'abscisse du point M, y est l'ordonnée et z est la cote.

b - Définition :

On dit que le repère est orthonormé si $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont trois vecteurs deux à deux orthogonaux et de même norme :

$$\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\|$$

2 - Colinéarité et alignement dans un repère de l'espace**Théorèmes :**

1. Deux vecteurs non nuls $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ sont colinéaires si, et

$$\text{seulement si, il existe } k \in \mathbb{R} \text{ tel que } \vec{u} = k\vec{v}, \text{ c'est à dire tel que } \begin{cases} x = kx' \\ y = ky' \\ z = kz' \end{cases} .$$

2. Si A et B sont deux points de coordonnées respectives $(x_A; y_A; z_A)$ et $(x_B; y_B; z_B)$, alors le vecteur $\vec{AB}$ est de coordonnées : $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$.

3. Trois points A , B et C de l'espace sont alignés si, et seulement si, il existe un réel k tel que $\vec{AB} = k\vec{AC}$.

3 - Milieu, distance**Théorèmes :**

1. Soit $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ et I le milieu du segment $[AB]$. On a alors : $I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right)$

2. Si, dans un repère orthonormé on a $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

3. Dans un repère orthonormé, la distance entre les points A et B est donnée par :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

V - Repérage dans l'espace**1 - Représentation paramétriques d'une droite****a - Théorème :**

Soit $M(x; y; z)$ un point de l'espace. On note (Δ) la droite passant par le point $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur

$$\text{non nul } \vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} .$$

$$M \in (\Delta) \text{ si, et seulement si, il existe un réel } t \text{ tel que : } \begin{cases} x = at + x_A \\ y = bt + y_A \\ z = ct + z_A \end{cases} .$$

b - Définition :

$$\begin{cases} x = at + x_A \\ y = bt + y_A \\ z = ct + z_A \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ est la représentation paramétrique de la droite } (\Delta).$$

Remarque : Si $t \in \mathbb{R}^+$, alors les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ ont le même sens, et dans ce cas, on obtient une représentation paramétrique de la demi-droite d'origine A et de même sens que $\vec{u}$.

2 - Représentation paramétrique d'un plan**a - Théorème :**

Soit $M(x; y; z)$ un point de l'espace et (P) le plan passant par le point $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteurs directeurs non

colinéaires $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$.

$M \in (P)$ si, et seulement si, il existe deux réels t et t' tels que :
$$\begin{cases} x = at + a't' + x_A \\ y = bt + b't' + y_A \\ z = ct + c't' + z_A \end{cases}.$$

b - Définition :

$$\begin{cases} x = at + a't' + x_A \\ y = bt + b't' + y_A \\ z = ct + c't' + z_A \end{cases}, t \text{ et } t' \in \mathbb{R} \text{ est la représentation paramétrique du plan } (P).$$

VI - Produit scalaire**1 - Les expressions du produit scalaire****a - Définition :**

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace ainsi que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ leurs représentants respectifs à partir du même point A .

Le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est donné par : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Ainsi, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans l'espace revient à calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ dans le plan.

b - Définition 1 :

Le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est défini par le nombre réel suivant : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.

Si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont les représentants respectifs de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ alors :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - CB^2).$$

c - Propriétés :

Pour tout vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on a :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$;
- $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$ et $\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v}) = \lambda \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$;
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$.

d - Définition 2 : avec l'aide du projeté orthogonal

Soit A , B et C trois points de l'espace et H le projeté orthogonal de B sur la droite (AC) . On a alors :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AH \times AC$, si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de même sens.
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AH \times AC$, si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de sens contraires.

e - Définition 3 : avec l'aide d'un angle

Soit A , B et C trois points de l'espace Alors : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\hat{A})$ où $\hat{A}$ est l'angle formé par les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Remarque : Les définitions 1, 2 et 3 sont équivalents.

2 - Orthogonalité**Propriétés :**

1. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan.
 $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si, et seulement si, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

2. Si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ sont dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

VII - Équations cartésiennes dans l'espace**1 - Vecteur normal à un plan****Définition**

Un vecteur normal à un plan (P) est un vecteur directeur d'une droite orthogonale à (P) .

2 - Orthogonalité de deux plans**Propriété**

Soit le plan (P_1) de vecteur normal $\vec{n}_1$ et (P_2) le plan de vecteur normal $\vec{n}_2$.
 Alors (P_1) et (P_2) sont orthogonaux si les vecteurs $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont orthogonaux.

3 - Équation cartésienne d'un plan

a - Propriété : Caractérisation d'un plan par un point et un vecteur normal.

Si A est un point de l'espace et $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ un vecteur non nul, alors l'ensemble des points $M(x; y; z)$ vérifiant $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est le plan (P) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

b - Propriété

Dans un repère orthonormé, toute équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$ (a, b et c non tous nuls) est celle d'un plan (P) de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

4 - Équations cartésiennes d'une droite**Propriété**

Si les triplets (a, b, c) et (a', b', c') ne sont pas proportionnels, le système $\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$ caractérise une droite et il est appelé système d'équations cartésiennes de cette droite.