Les nombres complexes

Exercice d'introduction :

Le but de cet exercice est de vérifier la validité de la formule de CARDAN.

Cette formule permet de trouver les solutions des équations du troisième degré de la forme $x^3 = px + q$.

La formule de CARDAN est donnée par :

$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}}$$

1. Déterminer les valeurs de p et q dans chacune des équations suivantes et indiquer les solutions respectives.

(a) $x^3 = 3x + 2$

(b) $x^3 = x + 1$

(c) $x^3 = 1$

2. Peut-on utiliser la formule de CARDAN pour l'équation $x^3 = 15x + 4$?

3. Sur $\mathbb{R}$, il n'existe pas de nombres dont le carré est négatif.

Supposons quand même qu'il existe dans un ensemble imaginaire un nombre dont le carré est égal à -1 . Ce nombre imaginaire vaut $\sqrt{-1}$.

(a) Développer et réduire les expressions suivantes : $(2 + \sqrt{-1})^3$ et $(2 - \sqrt{-1})^3$.

(b) En déduire les racines cubiques de $2 + 11\sqrt{-1}$ et $2 - 11\sqrt{-1}$.

(c) Montrer alors que l'équation précédente $x^3 = 15x + 4$ a pour solution le réel 4.

On obtient donc un résultat bien réel en utilisant un nombre imaginaire !

4. La notation $\sqrt{-1}$ est formellement interdite pour la simple raison que nous allons découvrir.

On a vu, plus haut, que $(\sqrt{-1})^2 = -1$. Calculer maintenant $(\sqrt{-1})^2$ d'une autre façon.

(a) On sait que $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$. Appliquer cette règle à $\sqrt{-1} \times \sqrt{-1}$.

(b) Que constatez-vous ?

Désormais, on notera par la lettre i le nombre imaginaire $\sqrt{-1}$.

I - Définition et représentation d'un nombre complexe

1 - Définition

L'ensemble des nombres complexes, noté $\mathbb{C}$, est l'ensemble des nombres de la forme $z = x + iy$, où x et y sont deux réels quelconques et i un nouveau nombre (imaginaire) tel que $i^2 = -1$.

- Le nombre x est la **partie réelle** de z . Le réel x peut être noté $Re(z)$.
- Le nombre y est la **partie imaginaire** de z . Le réel y peut être noté $Im(z)$.

$z = x + iy$ est la **forme algébrique** du complexe z .

Remarque :

- Si $z = yi$, alors z est un **imaginaire pur**.
- Si $z = x$, alors z est un **réel**.
- L'ensemble des réel $\mathbb{R}$ est inclus dans $\mathbb{C}$. On a alors : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

2 - Propriétés

1. L'écriture d'un nombre complexe de la forme $z = x + iy$, où x et $y \in \mathbb{R}$, est unique.
2. Soit $z = x + iy$ et $z' = x' + y'i$ deux nombres complexes avec x, y, x' et $y' \in \mathbb{R}$.
On a l'équivalence suivante : $z = z' \iff x = x'$ et $y = y'$.

3 - Définition

Soit $(O; \vec{u}, \vec{v})$ un repère orthonormé direct. Soit M un point du plan de coordonnées $(x; y)$ et $z = x + iy$ le nombre complexe associé.
 z est alors appelé l'**affiche** du point M .

De même, comme on peut le voir sur la figure, le vecteur $\vec{w}$ de coordonnées $(x; y)$ a pour affiche le nombre complexe $z = x + iy$.

4 - Théorème

L'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$, où z_A et z_B sont respectivement les affixes des points x et y .

Démonstration :

Soit $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points du plan d'affixes respectives $z_A = x_A + iy_A$ et $z_B = x_B + iy_B$.
Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a donc pour coordonnées $(x_B - x_A; y_B - y_A)$.

Ainsi, l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est :

$$\begin{aligned} z_{\overrightarrow{AB}} &= (x_B - x_A) + i(y_B - y_A) \\ &= (x_B + iy_B) - i(x_A - iy_A) \\ &= z_B - z_A \end{aligned}$$

$\implies \overrightarrow{AB}$ a pour affiche le complexe $z_B - z_A$

5 - Propriétés

Si M a pour affixe $z = x + iy$ et si M' a pour affixe $z' = x' + y'i$, avec x, y, x' et $y' \in \mathbb{R}$, alors le milieu du segment $[MM']$ a pour affixe $\frac{z + z'}{2}$.

6 - Définition

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe où x et $y \in \mathbb{R}$. Alors $\bar{z} = x - yi$ est le conjugué de z .

7 - Propriétés

Pour tout nombres complexes z et z' , on a :

1. $\frac{z + \bar{z}}{2} = Re(z)$ et $\frac{z - \bar{z}}{2i} = Im(z)$.	5. Si $z \neq 0$ alors $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{x}{x^2 + y^2} + i\frac{-y}{x^2 + y^2}$.
2. $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$ et $\overline{z - z'} = \bar{z} - \bar{z}'$.	6. Si $z\bar{z} = 1$, alors $\bar{z} = \frac{1}{z}$.
3. $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'$.	7. $z = \bar{z} \iff z$ est un réel .
4. $z\bar{z} \in \mathbb{R}$ et $z\bar{z} = x^2 + y^2$.	8. $z = -\bar{z} \iff z$ est un imaginaire pur.

Remarque : La propriété 4. sert dans la recherche de la forme algébrique d'inverses et des quotients.

Exemple : Mettez $z = \frac{2 + 4i}{1 - i}$ sous la forme algébrique.

II - Module et argument d'un nombre complexe

1 - Définition

Soit $(O; \vec{u}, \vec{v})$ un repère orthonormé direct. Soit M un point du plan complexe et z son affixe.

- Le module de z , noté $|z|$, est égal à la distance OM : $|z| = OM$.
- Si $z \neq 0$, l'argument de z , noté $arg(z)$, est la mesure en radian de l'angle orienté $(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$: $arg(z) = (\vec{u}; \overrightarrow{OM})$.

Conséquence :

- Si $z = x + iy$, où $x, y \in \mathbb{R}$, alors $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- Si les points x et y ont pour affixes respectifs z_A et z_B , alors $AB = |z_B - z_A|$.

2 - Propriétés : Modules

Pour tout nombres complexes z et z' , on a :

1. $z\bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2$
2. $|zz'| = |z||z'|$.
3. $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$.
4. Inégalité triangulaire : $||z| - |z'|| \leq |z + z'| \leq |z| + |z'|$.

3 - Propriétés : Arguments

Pour tout nombres complexes z et z' , on a :

1. Pour $z \neq 0$: $\arg(-z) = \arg(z) + \pi \quad [2\pi]$.
2. Pour $z \neq 0$: $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) \quad [2\pi]$.
3. $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') \quad [2\pi]$.
4. $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') \quad [2\pi]$.
5. $\arg(z) = 0 \quad (\pi) \iff z$ est un réel.
6. $\arg(z) = \frac{\pi}{2} \quad (\pi) \iff z$ est un imaginaire pur.

III - Résolution d'équations du second degré**Théorème**

Soit l'équation (E) : $az^2 + bz + c = 0$, où a, b et $c \in \mathbb{R}$ et $z \in \mathbb{C}$.

On note Δ le nombre réel tel que : $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions réelles :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$, il y a une seule solution réelles : $x_1 = \frac{-b}{2a}$.

- Si $\Delta < 0$,

- dans $\mathbb{R}$, il n'y a pas de solution.

- dans $\mathbb{C}$, il y a deux solutions complexes conjuguées z_1 et z_2 tels que $z_1 = \bar{z}_2$ avec :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

IV - Forme trigonométrique

1 - Définition

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe non nul où $x, y \in \mathbb{R}$.

On pose $|z| = \rho$ et $\arg(z) = \theta \quad (2\pi)$. On a alors : $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$.

La **forme trigonométrique** du complexe z est alors donnée par : $z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$.

Conséquences :

1. $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$.
2. $\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.
3. $\sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

V - Forme exponentielle

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe non nul où $x, y \in \mathbb{R}$ tel que : $|z| = \rho$ et $\arg(z) = \theta \quad [2\pi]$.

À partir de la forme trigonométrique du nombre complexe $z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$, on en déduit la **forme exponentielle** de z :

$$z = \rho e^{i\theta}.$$

VI - Formule de Moivre

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Remarque :

On peut démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall z \neq 0$, on a :

$$|z^n| = |z|^n \quad \text{et} \quad [\arg(z)]^n = n \times \arg(z) \quad [2\pi].$$

VII - Nombre complexe et géométrie

Le plan est muni d'une repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1 - Calcul d'angles

Théorème 1 :

Si A et B sont deux points distincts du plan complexe d'affixes respectives z_A et z_B alors :

$$(\vec{u} ; \overrightarrow{AB}) = \arg(z_B - z_A) \quad [2\pi].$$

Théorème 2 :

A, B, C et D sont des points d'affixes z_A, z_B, z_C et z_D tels que : $z_A \neq z_B$ et $z_C \neq z_D$.

Alors $(\overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)$.

2 - Caractérisation d'ensembles de points :

1. Soit ρ un nombre réel strictement positif et w un nombre complexe.

L'ensemble Γ des points M d'affixes z tels que $|z - w| = \rho$ est le cercle de centre $\Omega(w)$, d'affixe w et de rayon ρ .

Remarque :

L'égalité $|z - w| = \rho$ signifie que le nombre complexe $z - w$ a pour forme exponentielle $z - w = \rho e^{i\theta}$, où le réel θ est un de ces arguments.

Ainsi, Γ est aussi l'ensemble des points M dont l'affixe z est telle que $z = w + e^{i\theta}$, avec $\theta \in \mathbb{R}$.

2. A et B sont deux points distincts du plan complexe d'affixes respectives z_A et z_B .

L'ensemble Υ (lire upsilon) des points M d'affixes z tels que $|z - z_A| = |z - z_B|$ est la médiatrice du segment $[AB]$.

$$|z - z_A| = |z - z_B| \iff AM = BM$$